veau à l'intelligent animal qui répète cette manœuvre autant de fois qu'on le désire.

Pendant l'été, les douches lui sont très agréables, et chaque fois que les jardiniers arrosent les allées, il vient leur demander de diriger le jet d'eau sur lui; il prend alors les positions les plus bizarres, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, soulevant ses oreilles, ouvrant sa bouche où l'eau ruisselle en cascades, et il prend un plaisir extrême à cette opération.

S'il peut saisir la lance du tuyau avec sa trompe, il en fait un usage fort judicieux, se douchant avec beaucoup d'adresse de la tête à la queue [1].

Sarit, l'Éléphant femelle, appartient à la race dite *des Éléphants blancs;* elle est de couleur brique foncée, parsemée de petites taches roses; elle vient du Cambodge et nous a été donnée par M. Doumer, gouverneur général de l'Indo-Chine; à son arrivée, en avril 1899, elle mesurait 1 m. 57 et a gagné depuis 13 centimètres.

Moins intelligente que Koutch, elle sait pourtant remercier ceux qui lui offrent du pain et leur exprimer sa reconnaissance par de nombreuses génuflexions. Elle est plus délicate et plus sensible au froid que les Éléphants ordinaires et, pendant l'hiver, il faut la tenir dans une retraite bien chauffée.

Elle sort néanmoins tous les jours avec ses jeunes compagnons, et le meilleur accord règne entre eux.

Poissons envoyés par M. Jacquot d'Anthonay, vice-consul de France à Manaos (Brésil),

par M. le Dr J. Pellegrin.

Le Muséum d'histoire naturelle a reçu, il y a quelque temps, de M. Jacquot d'Anthonay, vice-consul de France à Manaos, une collection de Poissons contenant un certain nombre d'espèces intéressantes, parmi lesquelles plusieurs ne figuraient pas jusqu'ici dans ses galeries. En voici la liste générale :

Gymnodontidæ.....	Tetrodon psittacus Bloch, Schneider.
Gymnotidæ.....	Sternarchus tamandua Boulenger.
	Brachyramphichthys mirabilis Steindachner.
	Sternopygus virescens Valenciennes.
Clupeidæ.....	Pristigaster cayanus Cuvier.

[1] M. Milne Edwards fait passer sous les yeux des auditeurs une série de photographies représentant les diverses phases de la douche de Koutch.

Characinidæ.....	Anostomus fasciatus Spix.
	— tæniatus Kner.
	— trimaculatus Kner.
	Leporinus Frederici Bloch.
	— affinis Günther.
	— hypselonotus Günther.
	Tetragonopterus argenteus Cuvier.
	Anacyrtus microlepis Reinhardt.
	Cynodon vulpinus Spix.
	Serrasalmo Nattereri Kner.
	— maculatus Kner.
	Myletes parma Günther.
Siluridæ.....	Sorubim lima Bloch, Schneider.
	Platystomatichthys sturio Kner.
	Pimelodus eques Müller et Troschel.
	— gracilis Valenciennes.
	Pirinampus Agassizi Steindachner.
	Hypoptopoma Guentheri Boulenger.
	Loricaria cataphracta Linné.
	Vandellia cirrhosa Cuvier et Valenciennes.
Cichlidæ.....	Heros spurius Heckel.
	Mesops tæniatus Günther.
	Satanoperca jurupari Heckel.
	— proxima de Castelnau.
Sciænidæ.....	Sciæna amazonica de Castelnau.

Parmi les animaux composant cette collection, il y a lieu de mentionner :

1° Un bel exemplaire de 380 millimètres de longueur (caudale mutilée) du *Sternachus tamandua*, espèce décrite l'année dernière par M. Boulenger[1] sur un seul Poisson provenant de la rivière Jurua, où il est, dit-il, véritablement rare. Ce spécimen est donc le second qu'on ait signalé jusqu'ici.

2° Un curieux Siluridé dû aussi à M. Boulenger[2], *Hypoptopoma Guentheri*. Cet échantillon, d'une longueur de 102 millimètres, est en parfait état de conservation : or, ainsi que l'indique d'ailleurs M. Boulenger, comme cela arrive souvent pour cette espèce, il n'existe chez lui aucune trace d'épine dorsale postérieure. Le Muséum ne possédait aucun représentant de ce dernier genre.

[1] *Trans. Zool. Soc. London*, vol. XIV, part. 7, p. 421.

[2] *Proceed. Zool. Soc. London*, 1895, p. 526.